# Fiche Technique (22.9.2015)

## Maki Pat'

**IDENTITE**

RODENTICIDE TP14
CONTRE LES RATS (NOIRS ET BRUNS) ET SOURIS A L'INTERIEUR ET AUTOUR DES BATIMENTS PRIVES, PUBLICS ET AGRICOLES
Numéro d'autorisation: BE2013-0019

TYPE DE FORMULATION: Appât sous forme de pâte (RB)

Composition garantie: 0,005% bromadialone (CAS 28772-56-7)

TEL centre antipoison: 070 245 245

Détenteur de l'autorisation: : Liphatech S.A.S - Bonnel - BP 3 - F-47480 Pont Du Casse (France) - +33 (0)5 53 69 35 70

## USAGE

Formulation pâte à base d'un anticoagulant de deuxième génération : la BROMADIOLONE. A utiliser contre les rats (rats noirs et rats bruns) et souris, à l'intérieur et autour des bâtiments privés, publics et agricoles. L'action du produit est observable dans les 4 à 6 jours suivant l'ingestion du produit par les rongeurs. Une prise unique et faible suffit pour que les rongeurs succombent. Ce délai entre l'ingestion et la mort est inhérent au mode d'action des anticoagulants. Il permet de ne pas éveiller la méfiance des autres rongeurs qui continuent à consommer le produit.

## MODE D'EMPLOI

### Dose:

**Lutte contre des souris**: 50 g de produit par point d'appâtage tous les 2 à 3 mètres. En cas de forte infestation tous les 1 à 1,5 mètres.

**Lutte contre les rats**: 200 g de produit par point d'appâtage tous les 8 à 10 mètres. En cas de forte infestation tous les 4 à 5 mètres.

### Mode d'application:

Le port de gants est recommandé à chaque étape du traitement. Se laver les mains après toute utilisation / manipulation. Disposer le produit au plus près des traces des rongeurs (le long des murs, crottes, nids, voies de passages et des trous formés par les rongeurs).

Eviter la compétition alimentaire en éliminant le plus possible les sources d'alimentation à disposition sur le site. Le comportement alimentaire est différent entre le rat et la souris.

Lorsque le rat trouve une source d'aliment, il y consomme la quantité dont il a besoin. La souris a un comportement éclectique et consomme de faibles quantités sur de nombreuses sources d'aliment. Dans le traitement souris, il est donc nécessaire de quadriller la zone à traiter avec de nombreux postes. Les appâts doivent être déposés de manière sûre afin de minimiser le risque de consommation par les animaux ou par les enfants. Nous vous conseillons de protéger les appâts (par exemple sous des tuiles) de manière à ce qu'ils ne soient pas entrainés ailleurs. Vous pouvez également utiliser des postes d'appâtage sécurisés en particulier dans les zones alimentaires et publiques. Lors de l'application aux terriers, les appâts doivent être introduits sous terre et ne doivent pas être accessibles de l'extérieur. Le nombre de point d'appâtage est fonction du site de traitement, du contexte géographique, de l'importance et de la gravité de l'infestation. La quantité d'appâts disposés par point d'appâtage doit être adaptée aux doses d'application validées. Suivant l'infestation, la durée du traitement est laissée à l'appréciation de l'applicateur professionnel (de 2 à 5 semaines à titre indicatif). Chercher à récupérer les rongeurs morts à intervalles fréquents et réguliers, durant le traitement, par souci d'hygiène et afin qu'ils ne soient pas consommés par d'autres animaux. Eliminer les rongeurs en conformité avec la loi locale. Enlever tous les appâts après le traitement et les éliminer selon les recommandations ci-après. L'état de la résistance de la population cible doit être pris en considération lorsqu'on envisage d'utiliser un rodenticide. Les appâts doivent être disposés de façon à minimiser le risque de consommation par d'autres animaux ou des enfants. Si possible, sécurisez les appâts afin qu'ils ne puissent être emportés ailleurs. Empêcher l'accès aux appâts par les enfants, les oiseaux et les animaux non cibles (particulièrement les chiens, les chats, les porcs et les volailles). Hormis sous la supervision d'un applicateur professionnel ou d'une autre personne compétente, n'utilisez pas les rodenticides anticoagulants comme appâts permanents. Dans la plupart des cas, les appâts anticoagulants doivent être efficaces au bout de 35 jours. Eliminez les rongeurs morts conformément aux exigences locales. Les rongeurs empoisonnés peuvent être déposés par le professionnel auprès d'un incinérateur ou d'une décharge qui autorise les déchets de ce type ou collectés par un centre de collecte de déchets agréé pour être éliminés sur un site approprié.

## Stockage

Stocker le produit à l'abri de la lumière. Empêcher l'accès aux enfants, aux animaux de compagnie et aux animaux non cibles.

## Emballage

Seau en plastic 5 kg (sachets de 10 g)

## Destiné à

Rodenticide destiné à un usage professionnel. Produit en vente libre qui peut être utilisé librement par toute personne.